

植入式皮下注射器日常照護注意事項

一、皮下注射器之簡介

注射器是一種人工血管，有靜脈、動脈與腹腔三種植入方式。人工血管大小如十元硬幣，是一種矽質合成品與人體組織相容性高並不會發生特殊的影響，故安全性高。提供需要長期注射藥物的病患使用，可避免因長期重覆做靜脈注射而破壞血管。

二、植入注射器外科手術之方法

植入過程採局部麻醉方

式，經由手術方式裝在皮下，外觀不會受影響；外科醫師會依不同的治療方式和病人體型來選擇注射器的型式。

三、手術後的自我照護

靜脈植入較常見，一般是在胸前左上方或右上方附近，會有一道長約 3-4 公分的傷口，在傷口下方可以摸到鼓起圓形物的注射器，手術後當天如果有傷口疼痛或滲血情形，可立即通知醫護人員。之後需每日檢查植入處傷口有無發紅、腫、疼痛或分泌物情形。

手術傷口癒合後，在醫師

之允許下，護理人員會使用特製的蝴蝶彎針插入此注射器內注射點滴及藥物或輸血。注射期間，護士會每 7 天更換此彎針，並且每日消毒插針之部位。

四、出院後之日常照護

1. 傷口癒合後，不需覆蓋敷料。
2. 避免拉扯、扭曲輸液管路。
3. 避免注射器移位，裝置側的手臂勿做過度的運動，如 360 度旋轉手臂、劇烈運動或提舉重物。
4. 日常生活不受影響，可淋浴

及淋浴。

5. 了解置入的人工血管種類。
6. 避免導管阻塞，未使用時應定期回診沖洗植入器。

靜脈植入	每隔四週沖洗一次
動脈植入	每隔一週沖洗一次
腹腔植入	每隔兩週沖洗一次

7. 病人如有發燒、疼痛、呼吸不順暢、胸悶、呼吸喘等情形應立即返院就診。

雲林基督教醫院


關心您

參考資料：
雲林基督教醫院護理部：植入式皮下注射器（Port-A）照護指引。

制訂日期：2014年05月

修訂日期：2016年12月

植入式皮下注射器 日常照護注意事項



外科病房製作

諮詢專線：

(05)5871111 轉 2391

59593-P-C-006-02



雲林基督教醫院
YUNLIN CHRISTIAN HOSPITAL
648-66 雲林縣西螺鎮市場南路375號

「植入式皮下注射器日常照護注意事項」指導單張	指導者	病人/家屬 簽名